


Varotoimihuoneen siivous sairaalan vuodeosastolla

Infektioiden torjuntayksikkö 29.9.2026



Nämä ohjeet koskevat päivittäis- ja loppusiivousta **sairaalaosaston potilashuoneessa** ja sen yhteydessä olevassa wc-suihkutilassa tai potilaan käyttöön osoitetussa wc-tilassa.

Ohje sisältää mikrobikohtaisesti ohjeet suojautumisesta, siivousaineista ja desinfektiomenetelmistä sekä pyykin- ja jätteiden käsittelystä.

Varotoimihuoneiden siivouksessa huomioitavaa:

- Jos varotoimet päätetään kesken hoitojakson, tehdään päivittäissiivous tämän ohjeen mukaisesti ja varotoimet päättyvät sen jälkeen. Ohjeet tilanteeseen on kerrottu ohjekorteissa. Jos potilas siirretään puhtaaseen huoneeseen ja käytössä ollut huone siivotaan poislähtevänä paikkana.
- Nocospray-vetyperoksidikuivasumutus tehdään loppusiivouksen yhdessä niiden mikrobien kohdalla, joissa se on mainittu ja mainitut ehdot täyttyvät. Siivouksessa mekaaninen kattava puhdistustyö on ensisijainen. Nocospraylla tehostetaan desinfiointia ja se tehdään puhdistettuun huoneeseen. Jos laitetta ei ole, tehdään siivous tämän ohjeen mukaan.
- Paikkaeristys siivotaan tämän ohjeen mukaisesti suojautuneena ja ohjeen mukaisella siivousaineella. Suojaimia käytetään potilasvyöhykkeellä ja wc-tilassa. Nocospray käsittelyä ei tehdä.
- Jos potilas on ollut yksin usean potilaan huoneessa ja muut sängyt ovat olleet muovilla peitettynä, niitä ei tarvitse purkaa. Käyttämättömien potilasvyöhykkeiden kosketuspinnat, kuten sängynlaidat ja yöpöydät sekä lattia pyyhitään.

Ohjeita sairaalahuoltajalle

- Kun varotoimin hoidettu potilas kotiutuu
 - sovi potilashuoneen hoitovälineiden tyhjentämisestä ja huoltamisesta hoitohenkilökunnan kanssa
 - kysy kuinka pitkään potilas on ollut huoneessa, jos toimintaohje riippuu hoitoajan pituudesta (yleensä kosketusvarotoimet)
- Poista varotoimitarra vasta, kun siivous on tehty.
- Jos moniresistenttimikrobinkantajalla on pisaravarotoimia vaativa hengitystieinfektio, ovesa on molempien varotoimien tarra. Siivous tehdään moniresistentin mikrobin siivousohjeen mukaisesti. Käytä päivittäissiivouksessa lisäksi kirurgista suu-nenäsuojusta pisaravarotoimiohjeen mukaisesti.
- Käytä suojaimia ohjeiden mukaisesti ja huolehdi käsihygieniasta.
- Aloita siivous poistamalla näkyvät eritetahrat [kaksivaiheisen eritetahradesinfektion ohjeen](#) mukaisesti.
- Desinfioi siivousvälineet käytön jälkeen.
- Pakkaa jätteet ja pyykkit suoraan pusseihin ja sulje pussit ennen huoneen ulkopuolelle kuljettamista. Tarkista jätteiden ja pyykin jatkokuljetusta koskevat ohjeet lisäksi oman yksikkösi ohjeista, sillä käytännöt vaihtelevat toimipaikoittain.

1. Kosketusvarotoimet

1.1 MRSA, VRE, MDR Akinetobakteeri

Suojautuminen siivouksessa

- Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- Kertakäyttöiset suojakäsineet

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- Kosteat mikrokuitupyyhkeet
- Siivousaine: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %, lattian pyyhintä tehdään yleispuhdistusaineella

Pyykki ja jätteet

- Tavalliset pyykki- ja jätepussit

Varotoimet päättyvät kesken hoitojakson

- Varotoimia ei päätetä hoitojakson aikana

Loppusiivous vuodeosastolla

- Vaihda väliverhot, jos niissä on näkyvää likaa tai hoitojakso kestänyt yli 3 vuorokautta
- Hävitä vain näkyvästi likaiset, rikkiäiset tai lähes tyhjät suojakäsinelaatikot. Poista käyttökelpoisista käsinelaatikoista viisi käsinettä (alta vedettävissä riittää yksi).
- Tee wc-suihkutilassa viikkotyöt
- Tee vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) annoksella 1ml/m³ loppusiivouksen jälkeen, jos
 - potilas on ollut huoneessa yksin ja
 - hoitojakso on kestänyt yli 3 vuorokautta ja
 - potilashuoneessa on turvallista tehdä Nocospray-käsittely

1. Kosketusvarotoimet

1.2 Runsaasti erittävä haava- tai ihoinfektio, polio, paikallinen vyöruusu, vastasyntyneen herpes simplex tai aikuisen yleistynyt herpes simplex, märkärupi, lapsen enterovirusinfektio, eritteillä tuhriva asiakas

Suojautuminen

- Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- Kertakäyttöiset suojakäsineet

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- Kosteat mikrokuitupyyhkeet
- Siivousaine: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %, lattian pyyhintä tehdään yleispuhdistusaineella

Pyykki ja jätteet

- Tavalliset pyykki- ja jätepussit

Varotoimet päättyvät kesken hoitojakson

- Varotoimet päättyvät, kun päivittäissiivous on tehty: tee päivittäissiivous tämän ohjeen mukaisesti. Sovi ajankohta hoitajan kanssa. Potilasvuode pyyhitään ja pedataan puhtaaksi.

Loppusiivous vuodeosastolla

- Vaihda väliverhot, jos niissä on näkyvää likaa tai hoitojakso kestänyt yli 3 vuorokautta
- Hävitä vain näkyvästi likaiset, rikkinäiset tai lähes tyhjt suojakäsinelaatikot. Poista käyttökelpoisista käsinelaatikoista viisi käsinettä (alta vedettävissä riittää yksi).
- Tee wc-suihkutilassa viikkotyöt

1. Kosketusvarotoimet

1.3 CPE, ESBL-Klebsiella, ulkomailla sairaalahoidossa ollut potilas (seulonta kesken)

Suojautuminen

- Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- Kertakäyttöiset suojakäsineet

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- Kosteat mikrokuitupyyhkeet
- Siivousaine: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %, lattian pyyhintä tehdään yleispuhdistusaineella

Pyykki ja jätteet

- Potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- Tavalliset jätepussit
- Jos käytössä on kuilut tai imujärjestelmä, tilaa pyykille ja jätteelle kuljetus, älä pudota niitä kuiluun

Yhteiskäyttöisen wc-suihkutilan siivous potilaan peseytymisen jälkeen

- Vaihda puhtaat suihkuletkut
- Harjapese wc-suihkutila desinfektioaineella päivittäissiivousohjeen mukaisesti, myös suihkulaveri ja suihkutuoli. Huuhtelee ja kuivaa kaikki pinnat

Varotoimet päättyvät kesken hoitojakson

- Varotoimia ei päätetä hoitojakson aikana

Loppusiivous vuodeosastolla

- Vaihda väliverhot, jos niissä on näkyvää likaa tai hoitojakso kestänyt yli 3 vuorokautta
- Hävitä vain näkyvästi likaiset, rikkiäiset tai lähes tyhjt suojakäsinelaatikot. Poista käyttökelpoisista käsinelaatikoista viisi käsinettä (alta vedettävissä riittää yksi).
- Klooraa wc- ja suihkutilan käsienspesuallas, lattiakaivo ja wc-istuin ennen huoneen siivousta. Löydät kloorauksen ohjeen tämän ohjeen lopusta.
- Tee vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) annoksella 1ml/m³ loppusiivouksen jälkeen, jos
 - potilas on ollut huoneessa yksin ja
 - hoitojakso on kestänyt yli 3 vuorokautta ja
 - potilashuoneessa on turvallista tehdä Nocospray-käsittely

1. Kosketusvarotoimet

1.4 Candidozyma auris

Suojautuminen

- Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- Kertakäyttöiset suojakäsineet
- Pese kädet vedellä ja saippualla ja desinfioi kädet, kun poistut huoneesta

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- Kosketuspinnat pyyhitään kahdesti päivässä
- Kertakäyttöiset siivouspyyhkeet
- Kosketus-, taso- ja lattiapintojen pyyhintä, WC-suihkutilan siivous ja eritetahrat: Erisan Oxy+ 5 % tai Oxivir Plus 3,5 %

Pyykki ja jätteet

- Potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin.
- Tavalliset jätepussit
- Jos käytössä on kuilut tai imujärjestelmä, tilaa pyykille ja jätteelle kuljetus, älä pudota niitä kuiluun

Varotoimet päättyvät kesken hoitojakson

- Varotoimia ei päätetä hoitojakson aikana

Loppusiivous vuodeosastolla

- Vaihda väliverhot ja suojakäsinelaatikot
- Klooraa wc- ja suihkutilan käsienpesuallas, lattiakaivo ja wc-istuin ennen huoneen siivousta. Löydät kloorauksen ohjeen tämän ohjeen lopusta.
- Tee vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) annoksella 1ml/m3 loppusiivouksen jälkeen

1. Kosketusvarotoimet

1.5 Syyhy

Suojautuminen

- Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- Kertakäyttöiset suojakäsineet

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- Mikrokuitupyyhkeet (kostea)
- Yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- Potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- Tavalliset jätepussit
- Jos käytössä on kuilut tai imujärjestelmä, tilaa pyykille ja jätteelle kuljetus, älä pudota niitä kuiluun

Varotoimet päättyvät kesken hoitojakson

- Varotoimet päättyvät, kun päivittäissiivous on tehty: tee päivittäissiivous tämän ohjeen mukaisesti. Sovi ajankohta hoitajan kanssa. Potilasvuode pyyhitään ja pedataan puhtaaksi.

Loppusiivous vuodeosastolla

- Vaihda väliverhot, jos niissä on näkyvää likaa

1. Kosketusvarotoimet

1.6 Clostridioides difficile

Suojautuminen

- Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- Kertakäyttöiset suojakäsineet
- Kirurginen suu-nenäsuojus
- Pese kädet vedellä ja saippualla ja desinfioi kädet, kun poistut huoneesta

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- Kosteat mikrokuitupyyhkeet
- Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä, wc-suihkutilan siivous ja eritetahrat: Erisan Oxy+ **5 %** tai Oxivir Plus **15 %**
- Lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- Potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykipussiin
- Tavalliset jätepussit
- Jos käytössä on kuilut tai imujärjestelmä, tilaa pyykille ja jätteelle

kuljetus, älä pudota niitä kuiluun

Varotoimet päättyvät kesken hoitojakson

- Varotoimet päättyvät, kun päivittäissiivous on tehty: tee päivittäissiivous tämän ohjeen mukaisesti. Sovi ajankohta hoitajan kanssa. Potilasvuode pyyhitään ja pedataan puhtaaksi.

Poislähteväpaikka vuodeosastolla

- Vaihda väliverhot
- Hävitä vain näkyvästi likaiset, rikkiäiset tai lähes tyhjät suojakäsinelaatikot. Poista käyttökelpoisista käsinelaatikoista viisi käsinettä (alta vedettävissä riittää yksi).
- Tee wc-suihkutilassa viikkotyöt
- Tee vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) annoksella 1ml/m³ loppusiivouksen jälkeen, jos
 - potilas on ollut huoneessa yksin ja varotoimet on vielä käytössä ja
 - potilashuoneessa on turvallista tehdä Nocospray-käsittely

1. Kosketusvarotoimet

1.7 Ripuli- ja oksennustaudit

Suojautuminen

- Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- Kertakäyttöiset suojakäsineet
- Kirurginen suu-nenäsuojus
- Pese kädet vedellä ja saippualla ja desinfioi kädet, kun poistut huoneesta

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- Kosteat mikrokuitupyyhkeet
- Siivousaine: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %, lattian pyyhintä tehdään yleispuhdistusaineella

Pyykki ja jätteet

- Potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- Tavalliset jättepussit
- Jos käytössä on kuilut tai imujärjestelmä, tilaa pyykille ja jätteelle kuljetus, älä pudota niitä kuiluun

Varotoimet päättyvät kesken hoitojakson

- Varotoimet päättyvät, kun päivittäissiivous on tehty: tee päivittäissiivous tämän ohjeen mukaisesti. Sovi ajankohta hoitajan kanssa. Potilasvuode pyyhitään ja pedataan puhtaaksi.

Loppusiivous vuodeosastolla

- Vaihda väliverhot
- Hävitä vain näkyvästi likaiset, rikkinäiset tai lähes tyhjät suojakäsinelaatikot. Poista käyttökelpoisista käsinelaatikoista viisi käsinettä (alta vedettävissä riittää yksi).
- Tee wc-suihkutilassa viikkotyöt
- Tee vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) annoksella 1ml/m3 loppusiivouksen jälkeen, jos
 - potilas on ollut huoneessa yksin ja varotoimet on vielä käytössä ja
 - potilashuoneessa on turvallista tehdä Nocospray-käsittely

Jos yksikössä on norovirusta sairastava potilas, käytä yksikön yhteisten tilojen kosketuspintojen sekä wc-tilojen siivouksessa desinfektioainetta yleispuhdistusaineen sijaan, kunnes sairastuneen varotoimet on päätetty.

2. Pisaravarotoimet

2.1 Hengitystieinfektion oireet, influenssa, RSV, Haemophilus influenzaen aiheuttama ylähengitystieinfektio tai meningiitti, kurkkumätä, hinkuyskä, vihurirokko, sikotauti ja adenovirus, Covid-19 ja meningokokin aiheuttama sepsis, pneumonia tai meningiitti

Suojautuminen

- Kirurginen suu-nenäsuojus päivittäissiivouksessa
- Pitkähihainen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina päivittäis- ja loppusiivouksessa
- Kertakäyttöiset suojakäsineet siivouksen ohjeiden mukaisesti

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- Kosteat mikrokuitupyyhkeet
- Siivousaine: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %, lattian pyyhintä tehdään yleispuhdistusaineella

Pyykki ja jätteet

- Tavalliset pyykki- ja jätepussit

Varotoimet päättyvät kesken hoitojakson

- Tee päivittäissiivous tämän ohjeen mukaisesti. Varotoimet päätetään päivittäissiivouksen jälkeen. Sovi ajankohta hoitajan kanssa.

Loppusiivous vuodeosastolla

- Vaihda väliverhot, jos niissä on näkyvää likaa
- Hävitä vain näkyvästi likaiset, rikkiäiset tai lähes tyhjät suojakäsinelaatikot. Poista käyttökelpoisista käsinelaatikoista viisi käsinettä (alta vedettävissä riittää yksi).

3. Ilmavarotoimet

3.1 Hengitysteiden tuberkuloosi ja hengitysteiden ulkopuolinen tuberkuloosi, jossa aerosolimuodostus mahdollinen

Suojautuminen

- FFP3-hengityksensuojain - pue ja riisu hengityksensuojain potilashuoneen ulkopuolella
- Kertakäyttöiset suojakäsineet
- Suojatakki tai hihallinen esiliina, jos vaara eriteroiskeista

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- Mikrokuitupyyhkeet (kostea)
- Yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- Tavalliset pyykki- ja jättepussit

Varotoimet päättyvät kesken hoitojakson

- Ei aiheuta lisätoimia

Loppusiivous vuodeosastolla

- Voit siivota huoneen heti potilaan lähdettyä, kun puet tämän ohjeen mukaiset suojaimet. Jos potilaan lähdöstä on kulunut yli kaksi tuntia, hengityksensuojainta ei tarvitse käyttää.

4. Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet

4.1 Vesirokko, yleistynyt vyöruusu

Suojautuminen

- FFP2-hengityksensuojain - pue ja riisu hengityksensuojain potilashuoneen ulkopuolella
- Kertakäyttöiset suojakäsineet
- Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- Kosteat mikrokuitupyyhkeet
- Siivousaine: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %, lattian pyyhintä tehdään yleispuhdistusaineella

Pyykki ja jätteet

- Tavalliset pyykki- ja jätepussit

Varotoimet päättyvät kesken hoitojakson

Varotoimet päättyvät, kun päivittäissiivous on tehty: tee päivittäissiivous tämän ohjeen mukaisesti. Sovi ajankohta hoitajan kanssa. Potilasvuode pyyhitään ja pedataan puhtaaksi.

Loppusiivous vuodeosastolla

- Vaihda väliverhot, jos niissä on näkyvää likaa
- Hävitä vain näkyvästi likaiset, rikkiäiset tai lähes tyhjät suojakäsinelaatikot. Poista käyttökelpoisista käsinelaatikoista viisi käsinettä (alta vedettävissä riittää yksi).
- Tee wc-suihkutilassa viikkotyöt
- Tee vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) annoksella 1ml/m³ loppusiivouksen jälkeen, jos
 - potilas on ollut huoneessa yksin ja varotoimet on vielä käytössä ja
 - potilashuoneessa on turvallista tehdä Nocospray-käsittely

5. Ilmavarotoimet, kosketusvarotoimet ja pisaravarotoimet

5.1 M-rokko

Suojautuminen

- FFP2- tai FFP3-hengityksensuojain - pue ja riisu hengityksensuojain potilashuoneen ulkopuolella
- Kertakäyttöiset suojakäsineet
- Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- Visiiri tai suojalasit, jos on vaara eriteroiskeista

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- Kosteat mikrokuitupyyhkeet
- Siivousaine: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %, lattian pyyhintä tehdään yleispuhdistusaineella

Pyykki ja jätteet

- Potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- Vuodeosastolla potilashuoneen jätteet laitetaan UN-jäteastiaan (tartuntavaarallinen jäte)

- Jos käytössä on kuilut tai imujärjestelmä, tilaa pyykille ja jätteelle kuljetus, älä pudota niitä kuiluun.

Varotoimet päättyvät kesken hoitojakson

- Varotoimet päättyvät, kun päivittäissiivous on tehty: tee päivittäissiivous tämän ohjeen mukaisesti. Sovi ajankohta hoitajan kanssa. Potilasvuode pyyhitään ja pedataan puhtaaksi.

Loppusiivous vuodeosastolla

- Vaihda väliverhot ja suojakäsinelaatikot
- Tee wc-suihkutilassa viikkotyöt
- Tee vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) annoksella 1ml/m³ loppusiivouksen jälkeen, jos
 - potilas on ollut huoneessa yksin ja varotoimet on vielä käytössä ja
 - potilashuoneessa on turvallista tehdä Nocospray-käsittely

5. Ilma-, kosketus- ja pisaravarotoimet

5.2 Tuhkarokko ja lintuinfluenssa

Suojautuminen

- FFP2 tai FFP3 –hengityksensuojain - pue ja riisu hengityksensuojain potilashuoneen ulkopuolella
- Kertakäyttöiset suojakäsineet
- Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- Visiiri tai suojalasit

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- Kosteat mikrokuitupyyhkeet
- Siivousaine: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %, lattian pyyhintä tehdään yleispuhdistusaineella

Pyykki ja jätteet

- Potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- Tavalliset jätepussit

- Jos käytössä on kuilut tai imujärjestelmä, tilaa pyykille ja jätteelle kuljetus, älä pudota niitä kuiluun

Varotoimet päättyvät kesken hoitojakson

Varotoimet päättyvät, kun päivittäissiivous on tehty: tee päivittäissiivous tämän ohjeen mukaisesti. Sovi ajankohta hoitajan kanssa. Potilasvuode pyyhitään ja pedataan puhtaaksi.

Loppusiivous vuodeosastolla

- Vaihda väliverhot ja suojakäsinelaatikot
- Tee wc-suihkutilassa viikkotyöt
- Tee vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) annoksella 1ml/m³ loppusiivouksen jälkeen, jos
 - potilas on ollut huoneessa yksin ja varotoimet on vielä käytössä ja
 - potilashuoneessa on turvallista tehdä Nocospray-käsittely

6. Suojavarotoimet

Suojavarotoimia noudatetaan potilailla, joiden infektioiden vastustuskyky on heikentynyt.

Suojautuminen

- Käytä huoneessa kirurgista suu-nenäsuojusta
- Noudata huolellista käsihygieniaa, jotta et kuljeta mikrobeja potilaan huoneeseen

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- Kosteat mikrokuitupyyhkeet
- Yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- Tavalliset pyykki- ja jättepussit

Huomioitavaa

- Jos sairastat akuuttia infektiota, et voi osallistua suojavarotoimin hoidettavan potilaan huoneen siivoukseen
- Pyyhi yläpölyt ja puhdistat lattiakaivot loppusiivouksessa, ei hoitojakson aikana

- Vaihda suihkuletkut puhtaisiin kerran viikossa
- Älä avaa potilashuoneen ikkunaa hoitojakson aikana

Varotoimet päättyvät kesken hoitojakson

Ei aiheuta lisätoimia.

Loppusiivous vuodeosastolla

Tavanomainen loppusiivous.

7. Lutikat

Asiakas, jonka kotona todettu lutikoita ja torjuntatoimia ei ole tehty

Kun asiakas on vaihtanut puhtaan asun, omat vaatteet ja laukut on pakattu tiiviisiin pusseihin, eikä tilassa havaita lutikoita, voidaan hänen huoneensa siivota tavallisena potilaspaikkana.

Tilassa on havaittu tai epäillään olevan lutikoita

- Ota yksi lutikka teippiin kiinni tuholaistorjujaa varten. Hävitä elävät lutikat niitä havaitessasi.
- Kysy osastonhoitajalta, onko tuholaistorjuja jo antanut ohjeita tilan suhteen. Toimi saatujen ohjeiden mukaisesti.
- Pidä huoneen ovi suljettuna. Tee siivous vasta tuholaistorjujan käytyä. Jos huoneessa on ollut varotoimin hoidettava potilas, ota yhteyttä hygieniahoitajaan siivouksesta ennen tuholaistorjujan käyntiä.

Suojautuminen siivouksessa

- Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- Kertakäyttöiset suojakäsineet

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä

- Kertakäyttöiset siivouspyyhkeet
- Yleispuhdistusaine tai mikrobin mukainen desinfektioaine, jos potilaalla ollut varotoimet

Pyykki ja jätteet

- Pakkaa kaikki pyykki ja jäte huoneessa. Älä kuljeta huoneesta mitään pois pakkaamattomana.
- Pakkaa potilaspyykki ja vuodevaatteet liukenevaan pyykkipussiin ja laita se keltaiseen pyykkipussiin.
- Tavalliset jätepussit. Poikkeuksena Tays kampus, missä jätepussit pakataan punaiseen jätessäkkiin (biologinen ei-tunnistettava jäte).
- Sulje pyykki- ja jätepussit tiiviisti. Kirjaa pussien päälle Lutikka. Lutikoita sisältävää jätettä tai pyykkiä ei saa tiputtaa kuiluihin, tilaa kuljetus.

Siivous tuholaistorjujan käynnin jälkeen

- Huomioi tuholaistorjujan antamat ohjeet
- Torjunta-aineen vaikutusajan jälkeen puhdista pinnat yleispuhdistusaineella ja kertakäyttöisillä siivouspyyhkeillä. Laita pyyhkeet suoraan jätteisiin.
- Huoneen saa ottaa käyttöön tuholaistorjujan ohjeiden mukaisesti, kun pinnat on puhdistettu.

Lisätietoa lutikoista

8. Wc-suihkutilan vesikalusteiden klooraus sairaalan vuodeosastolla

Wc-suihkutilan vesikalusteiden klooraus (kohdat 1.3. ja 1.4) tehdään, jos potilas on ollut osastolla yön yli ja wc-suihkutilaa on käytetty. Potilashuoneen tai sulkuutilan käsiallasta ei kloorata.

Suojaimet

- nestettä läpäisemätön hihallinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kumisaappaat
- hengityksensuojain FFP2
- suojalasit tai visiiri
- nitrilisuojakäsineet

Tarvittavat välineet

- metallipöytä
- vuodesuoja ("kroonikkovaippa") metallipöydän suojaksi
- laimentamaton Klorilli
- mittakannu
- Kielto kyltti tai SEIS-tarra wc:n oveen

Toimintaohje

- Pue suojaimet
- Suojaa metallipöytä
- Kaada Klorillia 7,5dl mittakannuun metallipöydän päällä
- Kaada Klorilli hitaasti vesikalusteiden sisäosiin yläreunoja pitkin
- Käsienpesuallas 1,5 dl
- Lattiakaivo 2 dl
- Wc-istuin 4 dl
- Vaikutusaika on yksi tunti. Älä valuta wc-tilan hanoista vettä ennen vaikutusajan loppumista. Huuhtelee klorillikannu viileällä vedellä potilashuoneen puolella.
- Laita oveen kielto kyltti tai -tarra.
- Riisu suojaimet
- Vie välineet huuhteludesinfektioalitteeseen ja pyyhi aputaso

Wc-tilan loppusiivous kloorauksen jälkeen

- Pue suojaimet
- Vaihda puhtaat suihkuletkut ja -päät
- Harjaa wc-pytyn ja lattiakaivon sisäosat omilla harjoillaan
- Vaihda suojakäsineet
- Huuhtelee käsiallas, wc-istuin ja lattiakaivo varoen käsisuihkulla
- Tee huuhtelun jälkeen wc- ja suihkutilan loppusiivous ohjeen mukaisesti Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir plus 3,5 % -käyttöliuoksella.
- Harjapese käsienpesualtaan alue desinfektioaineella, kuten normaalistikin. Wc-pytyn sisäosan sekä lattiakaivon harjausta ei tarvitse toistaa, muista harjata ulkopinnat. Suihkuletku ja suihkupäitä ei tarvitse vaihtaa uudestaan.