

Varotoimihuoneen siivous sairaalassa

Päivitetty 23.10.2023

Noudata tätä ohjetta potilashuoneen ja sen yhteydessä olevan wc- ja suihkutilan sekä toimenpidehuoneen tai leikkaussalin päivittäis- ja loppusiivouksessa. Asumispalveluyksiköille ja päiväkohteihin on erilliset ohjeet. Siivouskäytännöt ohjeistaa puhtauspalveluiden tuottaja.

- Ennen siivoustyön aloittamista poista eritetahrat kaksivaiheisesti **kertakäyttöpyyhkeellä** ja eritetahroille soveltuvalla desinfektioaineella.
- Desinfioi siivousvälineet heti varotoimihuoneen siivouksen jälkeen.
- Pakkaa jätteet ja pyykit pusseihin potilashuoneessa tai toimenpidehuoneessa/salissa. Sulje pussit ennen huoneen ulkopuolelle kuljettamista. Tarkista jätteitä ja pyykkiä koskevat ohjeet lisäksi oman yksikkösi ohjeista, käytännöt vaihtelevat toimipaikoittain.
- Siivoustekstiilit tulisi ensisijaisesti pestä pesulassa. Jos siivoustekstiilit pestään itse, huolehdi pesemisen ohjeistuksesta.
- Ennen varotoimihuoneen loppusiivousta sovi hoitohenkilökunnan kanssa työnjaosta huoneen tyhjentämisestä.

Sisällys

1. Kosketusvarotoimet.....	2
1.1 MRSA, VRE, MDR Akinetobakteeri, ulkomailla sairaalahoidossa ollut potilas (seulonta kesken)	2
1.2 Runsaasti erittävä haava- tai ihoinfektio, polio, paikallinen vyöruusu, vastasyntyneen tai yleistynyt herpes simplex, märkärupi, lapsen enterovirusinfektio.....	3
1.3 ESBL-Klebsiella, Moniresistentti (MDR) Pseudomonas aeruginosa.....	4
1.4 KARBAPENEMAASIA TUOTTAVAT GRAMNEGATIIVISET SAUVABAKTEERIT (CPE).....	5
1.5 Candida auris	6
1.6 Täit, kihomadot.....	7
1.7 Syyhy	8
1.8 Lutikat	9
1.9 Ripuli- ja oksennustaudit, Clostridioides difficile	10
2. PISARAVAROTOIMET	11
2.1 Hengitystieinfektion oireet, influenssa, RSV, Haemophilus influenzae aiheuttama ylähengitystieinfektio tai meningiitti, kurkkumätä, hinkuyskä, meningokokin aiheuttama sepsis, pneumonia tai meningiitti (24 t lääkehoidon alusta), vihurirokko, sikotauti, Covid-19 altistunut	11
2.2 Varmistettu Covid-19 -infektio.....	12
3. Ilmavarotoimet	13
3.1 Hengitysteiden tuberkuloosi ja hengitysteiden ulkopuolinen tuberkuloosi, jossa aerosolimuodostus mahdollinen	13
4. Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet	14
4.1 Vesirokko, yleistynyt vyöruusu.....	14
5. Ilmavarotoimet, kosketusvarotoimet ja pisaravarotoimet	15
5.1 Apinarokko	15
5.2 Tuhkarokko	16
5.3 Lintuinfluenssa	17
6. Suojavarotoimet	18
7. Wc-tilan vesikalusteiden klooraus sairaalan vuodeosastolla.....	19



1. Kosketusvarotoimet

1.1 MRSA, VRE, MDR Akinetobakteeri, ulkomailta sairaalahoitossa ollut potilas (seulonta kesken)



Suojautuminen:

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kirurginen suu-nenäsuojus, kun on vaara eriteroiskeista

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

- mikrokuitupyyhkeet (kostea)
- soveltuva pintadesinfektioaine:
 - Erisan Oxy+ 2 % (Tays)
 - Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet:

- Tavalliset pyykki- ja jätepussit (myös mikrokuitupyyhkeet).
- Tavanomainen jatkokuljetus ja -käsittely, esimerkiksi kuiluun pudottaminen.

Loppusiivouksessa huomioitavaa:

- Vaihda väliverhot.
- Tee tyhjään huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen.

1.2 Runsaasti erittävä haava- tai ihoinfektio, polio, paikallinen vyöruusu, vastasyntyneen tai yleistynyt herpes simplex, märkärupi, lapsen enterovirusinfektio



Suojautuminen:

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kirurginen suu-nenäsuojus, kun on vaara eriteroiskeista

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

- mikrokuitupyyhkeet (kosteaa)
- soveltuva pintadesinfektioaine:
 - Erisan Oxy+ 2 % (Tays)
 - Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet:

- Tavalliset pyykki- ja jätepussit (myös mikrokuitupyyhkeet).
- Tavanomainen jatkokuljetus ja -käsittely, esimerkiksi kuiluun pudottaminen.

Loppusiivouksessa huomioitavaa:

- Vaihda väliverhot.



1.3 ESBL-Klebsiella, Moniresistentti (MDR) Pseudomonas aeruginosa



Suojautuminen:

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kirurginen suu-nenäsuojus, kun on vaara eriteroiskeista

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

- mikrokuitupyyhkeet (kostea)
- soveltuva pintadesinfektioaine:
 - Erisan Oxy+ 2 % (Tays)
 - Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet:

- Tavalliset pyykki- ja jättepussit (myös mikrokuitupyyhkeet).
- Tavanomainen jatkokuljetus ja -käsittely, esimerkiksi kuiluun pudottaminen.

Loppusiivouksessa huomioitavaa:

- Vaihda väliverhot.
- Klooraa wc- ja suihkutilan käsienpesuallas, lattiakaivo ja wc-istuin ennen huoneen siivousta (katso erillinen ohje).
- Tee tyhjäan huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen.

1.4 Karbapenemaasia tuottavat gramnegatiiviset sauvabakteerit (CPE)



Suojautuminen:

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kirurginen suu-nenäsuojus, kun on vaara eriteroiskeista

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

- mikrokuitupyyhkeet (kostea)
- soveltuva pintadesinfektioaine:
 - Erisan Oxy+ 2 % (Tays)
 - Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine päivittäissiivouksessa, loppusiivouksessa jokin yllä olevista desinfektioaineista

Pyykki ja jätteet:

- potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- mikrokuitupyyhkeet: tavanomainen käytäntö
- tavalliset jättepussit

Selvitä yksikkösi pyykin ja jätteen kuljetusohjeet.

- Tays kampus: tilaa kuljetus (Paketti), älä pudota pyykki- ja jättepusseja kuiluun.

Loppusiivouksessa huomioitavaa:

- Vaihda väliverhot.
- Klooraa wc- ja suihkutilan käsienpesuallas, lattiakaivo ja wc-istuin ennen huoneen siivousta (katso erillinen ohje).
- Tee tyhjään huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen.

1.5 Candida auris



Suojautuminen:

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kirurginen suu-nenäsuojus, kun on vaara eriteroiskeista

Huoneesta poistuessasi pese kädet vedellä ja saippualla. Desinfioi kädet pesun jälkeen.

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

Puhdista potilashuoneen kosketuspinnat ja lattia **kahdesti** päivässä.

- kertakäyttöiset siivouspyyhkeet
- soveltuva pintadesinfektioaine:
 - Erisan Oxy+ 5 % (Tays)
 - Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: jokin yllä olevista desinfektioaineista

Pyykki ja jätteet:

- potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin.
- tavalliset jättepussit

Selvitä yksikkösi pyykin ja jätteen kuljetusohjeet.

- Tays kampus: tilaa kuljetus (Paketti), älä pudota pyykki- ja jättepusseja kuluiun.

Loppusiivouksessa huomioitavaa:

- Vaihda väliverhot.
- Klooraa wc- ja suihkutilan käsienpesuallas, lattiakaivo ja wc-istuin ennen huoneen siivousta (katso erillinen ohje).
- Tee tyhjään huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen.
- Desinfektioainesiiivouksen ja vetyperoksidikuivasumutuksen jälkeen puhdas sulku, potilashuone ja wc-suihkutila siivotaan tavanomaiseen tapaan yleispuhdistusaineella ja mikrokuitupyhkeillä ennen käyttöönottoa. Selvitä tarve pintanäytteiden ottamiselle infektioyksiköstä.

1.6 Täit, kihomadot



Suojautuminen:

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kirurginen suu-nenäsuojus, kun on vaara eriteroiskeista

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

- mikrokuitupyyhkeet (kostea)
- yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet:

- potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- mikrokuitupyyhkeet: tavanomainen käytäntö
- tavalliset jättepussit
 - Tays kampus: jättepussit pakataan punaiseen jätessäkkiin (biologinen ei-tunnistettava jäte).

Selvitä yksikkösi pyykin ja jätteen kuljetusohjeet.

- Tays kampus: tilaa kuljetus (Paketti), älä pudota pyykki- ja jättepusseja kuiluun.

1.7 Syyhy



Suojautuminen:

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kirurginen suu-nenäsuojus, kun on vaara eriteroiskeista

Pese kädet vedellä ja saippualla huoneen siivouksen jälkeen. Desinfioi kädet pesun jälkeen.

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

- mikrokuitupyyhkeet (kostea)
- yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet:

- potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- mikrokuitupyyhkeet: tavanomainen käytäntö
- tavalliset jättepussit
 - Tays kampus: jättepussit pakataan punaiseen jättesäkkiin (biologinen ei-tunnistettava jäte)

Selvitä yksikkösi pyykin ja jätteen kuljetusohjeet.

- Tays kampus: tilaa kuljetus (Paketti), älä pudota pyykki- ja jättepusseja kuiluun.



1.8 Lutikat



Suojautuminen:

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kirurginen suu-nenäsuojus, kun on vaara eriteroiskeista

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

- kertakäyttöiset siivouspyyhkeet
- yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet:

- potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- tavalliset jättepussit
 - Tays kampus: jättepussit pakataan punaiseen jätesäkkiin (biologinen ei-tunnistettava jäte)

Selvitä yksikkösi pyykin ja jätteen kuljetusohjeet.

- Tays kampus: tilaa kuljetus (Paketti), älä pudota pyykki- ja jättepusseja kuiluun.

1.9 Ripuli- ja oksennustaudit, *Clostridioides difficile*



Suojautuminen:

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kirurginen suu-nenäsuojus

Pese kädet vedellä ja saippualla huoneesta poistuessasi ja eritetahradesinfektion jälkeen. Desinfioi kädet pesun jälkeen.

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

- mikrokuitupyyhkeet (kostea)
 - jos mikrokuitupyyhkeet pestään omassa yksikössä, käytä kertakäyttöisiä siivouspyyhkeitä
- soveltuva pintadesinfektioaine:
 - Erisan Oxy+ 2 % (Tays)
 - Oxivir Plus 3,5 % (varmistettu *Clostridioides difficile* 15 % käyttöliuos)
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet:

- potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- mikrokuitupyyhkeet: tavanomainen käytäntö
- tavalliset jättepussit

Selvitä yksikkösi pyykin ja jätteen kuljetusohjeet.

- Tays kampus: tilaa kuljetus (Paketti), älä pudota pyykki- ja jättepusseja kuiluun.

Loppusiivouksessa huomioitavaa:

- Vaihda väliverhot.
- Tee tyhjään huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen.

Huomioitavaa:

Kosketusvarotoimet voidaan purkaa kahden vuorokauden kuluttua oireiden loppumisesta.

2. Pesaravaroitimet

2.1 Hengitystieinfektion oireet, influenssa, RSV, Haemophilus influenzaen aiheuttama ylähengitystieinfektio tai meningiitti, kurkkumätä, hinkkuyskä, meningokokin aiheuttama sepsis, pneumonia tai meningiitti (24 t lääkehoidon alusta), vihurirokko, sikotauti, Covid-19 altistunut



Suojautuminen:

- Kirurginen suu-nenäsuojus, kun työskentelet alle kahden metrin etäisyydellä potilaasta, esimerkiksi päivittäissiivous.
- Pitkähihainen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina päivittäissiivouksen ajan sekä kun on vaara roiskeista.
- Kertakäyttöiset suojakäsineet siivouksen ohjeiden mukaisesti.
- Käytä lisäksi potilashuoneen päivittäissiivouksessa visiiriä tai suojalaseja, jos potilas yskii, aivastelee tai on limainen.

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

- mikrokuitupyyhkeet (kosteaa)
- soveltuva pintadesinfektioaine:
 - Erisan Oxy+ 2 % (Tays)
 - Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet:

- Tavalliset pyykki- ja jätepussit (myös mikrokuitupyyhkeet).
- Tavanomainen jatkokuljetus ja -käsittely, esimerkiksi kuiluun pudottaminen.

Loppusiivouksessa huomioitavaa:

- Jos varoitimet päättyvät kesken hoitojakson, ne päätetään päivittäissiivouksen jälkeen.

2.2 Varmistettu Covid-19 -infektio



Suojautuminen:

- Käytä kirurgisen suu-nenäsuojuksen sijaan FFP2-hengityksensuojainta, kun työskentelet pidempikestoisesti alle kahden metrin etäisyydellä potilaasta, esimerkiksi päivittäissiivous.
- Pitkähihainen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina päivittäissiivouksen ajan sekä kun on vaara roiskeista.
- Kertakäyttöiset suojakäsineet siivouksen ohjeiden mukaisesti.
- Käytä lisäksi päivittäissiivouksessa visiiriä tai suojalaseja, jos potilas yskii, aivastelee tai on limainen.

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

- mikrokuitupyyhkeet (kosteaa)
- soveltuva pintadesinfektioaine:
 - Erisan Oxy+ 2 % (Tays)
 - Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet:

- Tavalliset pyykki- ja jätepussit (myös mikrokuitupyyhkeet).
- Tavanomainen jatkokuljetus ja -käsittely, esimerkiksi kuiluun pudottaminen.

Loppusiivouksessa huomioitavaa:

- Jos varotoimet päättyvät kesken hoitojakson, ne päätetään päivittäissiivouksen jälkeen.

3. Ilmavarotoimet

3.1 Hengitysteiden tuberkuloosi ja hengitysteiden ulkopuolinen tuberkuloosi, jossa aerosolimuodostus mahdollinen



Suojautuminen:

- FFP3-hengityksensuojain
 - hengityksensuojain puetaan ja riisutaan huoneen ulkopuolella
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- suojatakki tai hihallinen esiliina, jos vaara eriteroiskeista

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

- mikrokuitupyyhkeet (kostea)
- yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet:


- Tavalliset pyykki- ja jättepussit (myös mikrokuitupyyhkeet).
- Tavanomainen jatkokuljetus ja -käsittely, esimerkiksi kuiluun pudottaminen.

Loppusiivouksessa huomioitavaa:

- Voit siivota huoneen heti potilaan lähdettyä, kun olet tämän ohjeen mukaiset suojaimet. Jos potilaan lähdöstä on kulunut yli kaksi tuntia, hengityksensuojainta ei tarvitse käyttää. Huomioi, että esimerkiksi leikkaussaleissa varoaika on lyhyempi tehokkaasta ilmavaihdosta johtuen.
- Seuraavan potilaan voi ottaa huoneeseen, kun edellisen lähdöstä on kulunut kaksi tuntia.

4. Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet

4.1 Vesirokko, yleistynyt vyöruusu



Suojautuminen:

- FFP2-hengityksensuojain
 - hengityksensuojain puetaan ja riisutaan huoneen ulkopuolella
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

- mikrokuitupyyhkeet (kostea)
- soveltuva pintadesinfektioaine:
 - Erisan Oxy+ 2 % (Tays)
 - Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet:

- Tavalliset pyykki- ja jätepussit (myös mikrokuitupyyhkeet).
- Tavanomainen jatkokuljetus ja -käsittely, esimerkiksi kuiluun pudottaminen.

Loppusiivouksessa huomioitavaa:

- Vaihda väliverhot.
- Tee tyhjään huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen.

5. Ilmavarotoimet, kosketusvarotoimet ja pisaravarotoimet

5.1 Apinarokko



Suojautuminen:

- FFP2- tai FFP3-hengityksensuojain
 - hengityksensuojain puetaan ja riisutaan huoneen ulkopuolella
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- visiiri tai suojalasit

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

- kertakäyttöiset siivouspyyhkeet
- soveltuva pintadesinfektioaine:
 - Erisan Oxy+ 2 % (Tays)
 - Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet:

- Potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin.
- Vuodeosastolla käytetään UN -jäteastiaa (tartuntavaarallinen jäte).
- Avokäynnillä tuleva jäte kerätään tavalliseen jättepussiin, joka suljetaan ja laitetaan toisen jättepussin sisään niin, ettei ulompi pussi kontaminoidu. Ulompi pussi suljetaan huolellisesti.

Selvitä yksikkösi pyykin ja jätteen kuljetusohjeet.

- Tays kampus: tilaa kuljetus (Paketti), älä pudota pyykki- ja jättepusseja kuluiun.

Loppusiivouksessa huomioitavaa:

- Vaihda väliverhot.
- Tee tyhjäan huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen.

5.2 Tuhkarokko



Suojautuminen:

- FFP2-hengityksensuojain
 - hengityksensuojain puetaan ja riisutaan huoneen ulkopuolella
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- visiiri tai suojalasit, jos on vaara eriteroiskeista

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

- mikrokuitupyyhkeet (kosteaa)
- soveltuva pintadesinfektioaine:
 - Erisan Oxy+ 2 % (Tays)
 - Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine


Pyykki ja jätteet:

- Tavalliset pyykki- ja jätepussit (myös mikrokuitupyyhkeet).
- Tavanomainen jatkokuljetus ja -käsittely, esimerkiksi kuiluun pudottaminen.

Loppusiivouksessa huomioitavaa:

- Vaihda väliverhot.
- Tee tyhjäan huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen.

5.3 Lintuinfluenssa



Suojautuminen:

- FFP2- tai FFP3-hengityksensuojain
 - hengityksensuojain puetaan ja riisutaan huoneen ulkopuolella
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kertakäyttöinen nestettä läpäisemätön suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- visiiri tai suojalasit

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

- kertakäyttöiset siivouspyyhkeet
- soveltuva pintadesinfektioaine:
 - Erisan Oxy+ 2 % (Tays)
 - Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet:

- potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- tavalliset jättepussit

Selvitä yksikkösi pyykin ja jätteen kuljetusohjeet.

- Tays kampus: Tilaa kuljetus (Paketti), älä pudota pyykki- ja jättepusseja kuiluun.

Loppusiivouksessa huomioitavaa:

- Vaihda väliverhot.
- Tee tyhjään huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen.



6. Suojavarotoimet

Suojavarotoimia noudatetaan potilailla, joiden infektioiden vastustuskyky on heikentynyt vaikean perustaudin tai siihen annetun hoidon vuoksi.



Suojautuminen:

- Käytä huoneessa kirurgista suu-nenäsuojusta.
- Noudata huolellista käsihygieniaa, jotta et kuljeta mikrobeja potilaan huoneeseen.
- Käytä suojatakia- tai hihallista esiliinaa, kun on vaara roiskeista työasuun.

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä:

- mikrokuitupyhkeet
- yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet:

- Tavalliset pyykki- ja jättepussit (myös mikrokuitupyhkeet).
- Tavanomainen jatkokuljetus ja -käsittely, esimerkiksi kuiluun pudottaminen.

Huomioitavaa:

- Mikäli sairastat akuuttia infektiota, et voi osallistua suojavarotoimin hoidettavan potilaan huoneen siivoukseen.
- Pyyhi yläpölyt ja puhdista lattiakaivot loppusiivouksessa, ei hoitojakson aikana.
- Vaihda suihkuletkut puhtaisiin viikoittain.
- Älä avaa potilashuoneen ikkunaa hoitojakson aikana.

7. Wc-tilan vesikalusteiden klooraus sairaalan vuodeosastolla

Varotoimihuoneissa 1.3. ESBL-Klebsiella tai MDR Pseudomonas, 1.4 CPE ja 1.5 Candida auris tehdään loppusiivouksen yhteydessä wc- ja suihkutilan vesikalusteiden klooraus, mikäli potilas on ollut osastolla yön yli ja wc- ja suihkutilaa on käytetty. Potilashuoneen tai sulkutilan käsihallasta ei ole tarpeen kloorata.

Suojaimet:

- nestettä läpäisemätön hihallinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kumisaappaat
- hengityksensuojain FFP2
- silmäsuojain (suojalasit tai visiiri)
- nitrilisuojakäsineet (EN374)
 - vaihda käsineet, jos niihin tulee roiskeita
 - riisu käsineet välittömästi työskentelyn jälkeen

Tarvittavat välineet:

- metallipöytä
- vuodesuoja ("kroonikkovaippa") metallipöydän suojaksi
- laimentamaton Klorilli
- mittakannu
- kieltokyltti/SEIS-tarra wc:n oveen

Toimintaohje:

1. Pue suojaimet
2. Kaada rauhallisin liikkein Klorillia erilliseen mittakannuun suojatun metallipöydän päällä
3. Valuta Klorilli hitaasti vesikalusteiden sisäosiin
 1. Käsienspesuallas 1,5 dl - kaada klorilli suoraan viemäriin, varo roiskeita altaan pohjalle (pyyhi mahdolliset roiskeet runsaalla vedellä kostutetulla paperilla, vaihda suojakäsineet)
 2. Lattiakaivo 2 dl yläreunoja pitkin
 3. Wc-istuin: 4 dl yläreunoja pitkin
4. Sulje wc-tilan ovi huolellisesti ja laita oveen kieltokyltti tai -tarra
5. Anna Klorillin vaikuttaa 60 min. Älä valuta wc-tilan hanoista vettä ennen vaikutusajan loppumista.
6. Riisu suojaimet
7. Pura aputaso ja pyyhi pinnat

Wc-tilan loppusiivous kloorauksen jälkeen:

1. Pue suojaimet. FFP2-hengityksensuojainta käytetään wc-tilan siivouksen ajan.
1. Vaihda ensimmäisenä puhtaat suihkuletkut ja -päät.
2. Harjaa wc-pytyn ja lattiakaivon sisäosat omilla harjoillaan, aiemmin valutettu Klorilli riittää desinfektioaineeksi. Varo roiskeita.
3. Riisu suojakäsineet, desinfioi kädet ja pue uudet suojakäsineet.
4. Huuhtelee käsihallan, wc-istuin ja lattiakaivo rauhallisesti käsisuihkulla, varo roiskeita.
5. Tee tämän jälkeen wc- ja suihkutilan loppusiivous ohjeiden mukaisesti, voit käyttää Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir plus 3,5 % -käyttöliuosta.
 - Suihkuletku ja suihkupäitä ei tarvitse vaihtaa uudestaan, mikäli ne pysyvät puhtaina.
 - Käsihallan pohja harjataan desinfektioaineella. Wc-pytyn sisäosan sekä lattiakaivon harjausta ei tarvitse toistaa.