

Varotoimihuoneen siivous sairaalassa

Päivitetty 3.4.2025

Tästä ohjeesta löydät varotoimiluokkakohtaisesti huomioitavat ohjeet suojaumisesta, siivousaineista ja desinfiointimenetelmistä sekä pyykin- ja jätteiden käsittelystä. Nämä ohjeet koskevat sairaalaosaston potilashuoneen ja sen yhteydessä olevassa wc-suihkutilan tai potilaan käyttöön osoitetun wc-tilan päivittäis- ja loppusiivousta.

- Potilaan kotiutuessa sovi potilashuoneen hoitovälineiden tyhjentämisestä ja huoltamisesta hoitohenkilökunnan kanssa. Huoneen tyhjentäminen on kuvattu [sairaalaaluonnon varotoimihuoneiden siivousta koskevassa ohjekortissa \(intra\)](#).
- Jos yksikössä on käytössä varotoimitarrat, poista tarra vasta kun siivous on tehty.
- Käytä suojaimia ohjeiden mukaisesti ja huolehdi käsihygieniasta.
- Aloita siivous poistamalla näkyvät eritetahrat [kaksivaiheisen eritetahradesinfektion ohjeen](#) mukaisesti.
- Desinfioi siivousvälineet käytön jälkeen.
- Pakkaa jätteet ja pyykki suoraan pusseihin ja sulje pussit ennen huoneen ulkopuolelle kuljettamista. Tarkista jätteitä ja pyykkiä koskevat ohjeet lisäksi oman yksikkösi ohjeista, sillä käytännöt vaihtelevat toimipaikoittain.
- Paikkaeristys siivotaan tämän ohjeen mukaisesti suojautuneena ja ohjeen mukaisella siivousaineella.
- Jos moniresistenttimikrobinkantajalla on pisaravarotoimia vaativa hengitystieinfektio, esimerkiksi CPE ja hengitystieinfektio: Laita oveen molempien varotoimien tarra. Tässä tilanteessa tee siivous moniresistentin mikrobin siivousohjeen mukaisesti. Käytä päivittäissiivouksessa kirurgista suu-nenäsuojusta tai FFP2-hengityksensuojainta käytössä olevan pisaravarotoimiohjeen mukaisesti.

1. Kosketusvarotoimet

1.1 MRSA, VRE, MDR Akinetobakteeri

1.2 Runsaasti erittävä haava- tai ihoinfektio, polio, paikallinen vyöruusu, vastasyntyneen herpes simplex tai aikuisen yleistynyt herpes simplex, märkärupi, lapsen enterovirusinfektio, eritteillä tuhriva asiakas

1.3 CPE, ESBL-Klebsiella, ulkomailla sairaalahoidossa ollut potilas (seulonta kesken)

1.4 Candida auris

1.5 Syyhy

1.6 Clostridioides difficile

1.7 Ripuli- ja oksennustaudit

2. Pisaravarotoimet



- 2.1 Hengitystieinfektion oireet, influenssa, RSV, Haemophilus influenzaen aiheuttama ylähengitystieinfektio tai meningiitti, kurkkumätä, hinkuyskä, meningokokin aiheuttama sepsis, pneumonia tai meningiitti (24 t lääkehoidon alusta), vihurirokko, sikotauti ja adenovirus
- 2.2 Varmistettu Covid-19 -infektio
- 3. Ilmavarotoimet
 - 3.1 Hengitysteiden tuberkuloosi ja hengitysteiden ulkopuolinen tuberkuloosi, jossa aerosolimuodostus mahdollinen
- 4. Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet
 - 4.1 Vesirokko, yleistynyt vyöruusu
- 5. Ilmavarotoimet, kosketusvarotoimet ja pisaravarotoimet
 - 5.1 Apinarokko
 - 5.2 Tuhkarokko ja lintuinfluenssa
- 6. Suojavarotoimet
- 7. Lutikat
- 8. Wc-tilan vesikalusteiden klooraus sairaalan vuodeosastolla

1.Kosketusvarotoimet

1.1 MRSA, VRE, MDR Akinetobakteeri

Suojautuminen

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- kosteat mikrokuitupyyhkeet
- kosketus- ja tasopintojen pyyhintä sekä wc-suihkutilan siivous: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- tavalliset pyykki- ja jätepussit

Loppusiivous vuodeosastolla

- vaihda väliverhot, jos niissä on näkyvää likaa tai hoitajakso kestänyt yli 3 vuorokautta
- poista näkyvästi likaiset, rikkinäiset tai lähes tyhjät suojakäsineelaatikat
- tee wc-suihkutilassa viikkotyöt
- tee huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen

1.2 Runsaasti erittävä haava- tai ihoinfektio, polio, paikallinen vyöruusu, vastasyntyneen herpes simplex tai aikuisen yleistynyt herpes simplex, märkärupi, lapsen enterovirusinfektio, eritteillä tuhriva asiakas

Suojautuminen

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- kosteat mikrokuitupyyhkeet
- kosketus- ja tasopintojen pyyhintä sekä wc-suihkutilan siivous: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- tavalliset pyykki- ja jättepussit

Loppusiivous vuodeosastolla

- vaihda väliverhot, jos niissä on näkyvää likaa tai hoitajakso kestänyt yli 3 vuorokautta
- poista näkyvästi likaiset, rikkinäiset tai lähes tyhjät suojakäsineelaatikat
- tee wc-suihkutilassa viikkotyöt

1.3 CPE, ESBL-Klebsiella, ulkomailta sairaalahoitossa ollut potilas (seulonta kesken)

Suojautuminen

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- kosteat mikrokuitupyyhkeet
- kosketus- ja tasopintojen pyyhintä sekä wc-suihkutilan siivous: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- tavalliset jättepussit
- selvitä yksikkösi pyykin ja jätteen kuljetusohjeet, älä pudota pyykki- ja jättepusseja kuiluun

Yhteiskäyttöisen wc-suihkutilan siivous potilaan peseytymisen jälkeen

- vaihda puhtaat suihkuletkut
- harjapese suihkulaveri ja suihkutuoli desinfektioneella
- harjapese wc-suihkutila desinfektioaineella päivittäissiivousohjeen mukaisesti
- huuhtelee ja kuivaa kaikki pinnat

Loppusiivous vuodeosastolla

- vaihda väliverhot, jos niissä on näkyvää likaa tai hoitojakso kestänyt yli 3 vuorokautta
- poista näkyvästi likaiset, rikkinäiset tai lähes tyhjät suojakäsineelaatikot
- klooraa wc- ja suihkutilan käsienspesuallas, lattiakaivo ja wc-istuin ennen huoneen siivousta (löydät kloorauksen ohjeen tämän ohjeen lopusta)
- tee huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen

1.4 Candida auris*Suojautuminen*

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- pese kädet vedellä ja saippualla ja desinfioi kädet, kun poistut huoneesta

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- kosketuspinnat pyyhitään kahdesti päivässä
- kertakäyttöiset siivouspyyhkeet
- kosketus-, taso- ja lattiapintojen pyyhintä, WC-suihkutilan siivous ja eritetahrat:
 - Erisan Oxy+ 5 % tai Oxivir Plus 3,5 %

Pyykki ja jätteet

- potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin.
- tavalliset jättepussit
- selvitä yksikkösi pyykin ja jätteen kuljetusohjeet, älä pudota pyykki- ja jättepusseja kuiluun

Loppusiivous vuodeosastolla

- vaihda väliverhot ja suojakäsineita
- klooraa wc- ja suihkutilan käsienspesuallas, lattiakaivo ja wc-istuin ennen huoneen siivousta (löydät kloorauksen ohjeen tämän ohjeen lopusta)
- tee huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen

1.5 Syyhy

Suojautuminen

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- pese kädet vedellä ja saippualla ja desinfioi kädet, kun poistut huoneesta

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- mikrokuitupyyhkeet (kostea)
- yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- tavalliset jättepussit
- selvitä yksikkösi pyykin ja jätteen kuljetusohjeet, älä pudota pyykki- ja jättepusseja kuiluun

Loppusiivous vuodeosastolla

- vaihda väliverhot, jos niissä on näkyvää likaa
- poista näkyvästi likaiset, rikkinäiset tai lähes tyhjät suojakäsineita

1.6 Clostridioides difficile

Suojautuminen

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kirurginen suu-nenäsuojus
- pese kädet vedellä ja saippualla ja desinfioi kädet, kun poistut huoneesta

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- kosteat mikrokuitupyyhkeet
- kosketus- ja tasopintojen pyyhintä, wc-suihkutilan siivous ja eritetahrat: Erisan Oxy+ **5 %** tai Oxivir Plus **15 %**
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- tavalliset jättepussit
- selvitä yksikkösi pyykin ja jätteen kuljetusohjeet, älä pudota pyykki- ja jätepusseja kuiluun

Loppusiivous vuodeosastolla

- vaihda väliverhot ja suojakäsineelaatikot
- tee wc-suihkutilassa viikkotyöt
- tee huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen

1.7 Ripuli- ja oksennustaudit

Jos yksikössä on norovirusta sairastava potilas/asukas, käytä yksikön yhteisten tilojen kosketuspintojen sekä wc-tilojen siivouksessa desinfektioainetta yleispuhdistusaineen sijaan, kunnes sairastuneen varotoimet on päätetty.

Suojautuminen

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kirurginen suu-nenäsuojus

- pese kädet vedellä ja saippualla ja desinfioi kädet, kun poistut huoneesta

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- kosteat mikrokuitupyyhkeet
- kosketus- ja tasopintojen pyyhintä sekä wc-suihkutilan siivous: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- tavalliset jättepussit
- selvitä yksikkösi pyykin ja jätteen kuljetusohjeet, älä pudota pyykki- ja jättepusseja kuiluun

Loppusiivous vuodeosastolla

- vaihda väliverhot ja suojakäsineita
- tee wc-suihkutilassa viikkotyöt
- tee huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen

2. Pesaravarotoimet

2.1 Hengitystieinfektion oireet, influenssa, RSV, Haemophilus influenzaen aiheuttama ylähengitystieinfektio tai meningiitti, kurkkumätä, hinkkuyskä, meningokokin aiheuttama sepsis, pneumonia tai meningiitti (24 t lääkehoidon alusta), vihurirokko, sikotauti ja adenovirus

Suojautuminen

- Kirurginen suu-nenäsuojus päivittäissiivouksessa
 - lisäksi visiiri tai suojalasit, jos potilas yskii, aivastelee tai on limainen
- Pitkähihainen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina päivittäis- ja loppusiivouksessa
- Kertakäyttöiset suojakäsineet siivouksen ohjeiden mukaisesti

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- kosteat mikrokuitupyyhkeet
- kosketus- ja tasopintojen pyyhintä sekä wc-suihkutilan siivous: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %

- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- tavalliset pyykki- ja jättepussit

Loppusiivous vuodeosastolla:

- vaihda väliverhot, jos niissä on näkyvää likaa
- poista näkyvästi likaiset, rikkinäiset tai lähes tyhjät suojakäsineelaatikat
- tavanomainen loppusiivous; käytä suojatakkia ja desinfektioainetta
- jos varotoimet päättyvät kesken hoitojakson, ne päätetään päivittäissiivouksen jälkeen

2.2 Varmistettu Covid-19 -infektio

Suojautuminen

- FFP2-hengityksensuojain päivittäissiivouksessa
 - lisäksi visiiri tai suojalasit, jos potilas yskii, aivastelee tai on limainen
- Pitkähihainen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina päivittäis- ja loppusiivouksessa
- Kertakäyttöiset suojakäsineet siivouksen ohjeiden mukaisesti

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- kosteat mikrokuitupyyhkeet
- kosketus- ja tasopintojen pyyhintä sekä wc-suihkutilan siivous: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- tavalliset pyykki- ja jättepussit

Loppusiivous vuodeosastolla

- vaihda väliverhot, jos niissä on näkyvää likaa
- poista näkyvästi likaiset, rikkinäiset tai lähes tyhjät suojakäsineelaatikat
- tavanomainen loppusiivous, käytä suojatakkia ja desinfektioainetta
- jos varotoimet päättyvät kesken hoitojakson, ne päätetään päivittäissiivouksen jälkeen

3. Ilmavarotoimet

3.1 Hengitysteiden tuberkuloosi ja hengitysteiden ulkopuolinen tuberkuloosi, jossa aerosolimuodostus mahdollinen

Suojautuminen

- FFP3-hengityksensuojain
 - pue ja riisu hengityksensuojain potilashuoneen ulkopuolella
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- suojatakki tai hihallinen esiliina, jos vaara eriteroiskeista

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- mikrokuitupyyhkeet (kostea)
- yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- tavalliset pyykki- ja jättepussit

Loppusiivous vuodeosastolla

- voit siivota huoneen heti potilaan lähdettyä, kun olet tämän ohjeen mukaiset suojaimet. Jos potilaan lähdöstä on kulunut yli kaksi tuntia, hengityksensuojainta ei tarvitse käyttää. Huomioi, että esimerkiksi leikkaussaleissa varoaika on lyhyempi tehokkaasta ilmavaihdosta johtuen.
- jos huoneen ilmanvaihtotiheys ei ole tiedossa, seuraavan potilaan voi ottaa huoneeseen, kun edellisen lähdöstä on kulunut kaksi tuntia.

4. Ilmavarotoimet ja kosketusvarotoimet

4.1 Vesirokko, yleistynyt vyöruusu

Suojautuminen

- FFP2-hengityksensuojain
 - pue ja riisu hengityksensuojain potilashuoneen ulkopuolella
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- kosteat mikrokuitupyyhkeet
- kosketus- ja tasopintojen pyyhintä sekä wc-suihkutilan siivous: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- tavalliset pyykki- ja jätepussit

Loppusiivous vuodeosastolla

- vaihda väliverhot, jos niissä on näkyvää likaa tai hoitojakso kestänyt yli 3 vuorokautta
- poista näkyvästi likaiset, rikkinäiset tai lähes tyhjät suojakäsineelaatikat
- tee wc-suihkutilassa viikkotyöt
- tee huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen

5. Ilmavarotoimet, kosketusvarotoimet ja pisaravarotoimet**5.1 Apinarokko***Suojautuminen*

- FFP2- tai FFP3-hengityksensuojain
 - pue ja riisu hengityksensuojain potilashuoneen ulkopuolella
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- visiiri tai suojalasit, jos on vaara eriteroiskeista

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- kosteat mikrokuitupyyhkeet
- kosketus- ja tasopintojen pyyhintä sekä wc-suihkutilan siivous: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- Potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- Vuodeosastolla potilashuoneen jätteet laitetaan UN-jäteastiaan (tartuntavaarallinen jäte)
- Avokäynnillä tuleva jäte kerätään tavalliseen jättepussiin. Laita suljettu jättepussi toisen jättepussin sisään niin, ettei ulompi pussi likaannu ja sulje päällimmäinen pussi.
- Selvitä yksikkösi pyykin ja jätteen kuljetusohjeet, älä pudota pyykki- ja jättepusseja kuiluun

Loppusiivous vuodeosastolla

- vaihda väliverhot ja suojakäsineita
- tee wc-suihkutilassa viikkotyöt
- tee huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen

5.2 Tuhkarokko ja lintuinfluenssa

Suojautuminen

- FFP2 tai FFP3 -hengityksensuojain
 - pue ja riisu hengityksensuojain potilashuoneen ulkopuolella
- kertakäyttöiset suojakäsineet
- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- visiiri tai suojalasit

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- kosteat mikrokuitupyyhkeet
- kosketus- ja tasopintojen pyyhintä sekä wc-suihkutilan siivous: Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir Plus 3,5 %
- lattian pyyhintä: yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- potilaspyykki ja vuodevaatteet: liukeneva pyykkipussi, joka laitetaan keltaiseen pyykkipussiin
- tavalliset jättepusset

- selvitä yksikkösi pyykin ja jätteen kuljetusohjeet, älä pudota pyykki- ja jätepusseja kuiluun

Loppusiivous vuodeosastolla

- vaihda väliverhot ja suojakäsine-laatikot
- tee wc-suihkutilassa viikkotyöt
- tee huoneeseen vetyperoksidikuivasumutus (Nocospray) loppusiivouksen jälkeen

6. Suojavarotoimet

Suojavarotoimia noudatetaan potilailla, joiden infektioiden vastustuskyky on heikentynyt.

Suojautuminen

- käytä huoneessa kirurgista suu-nenäsuojusta
- noudata huolellista käsihygieniaa, jotta et kuljeta mikrobeja potilaan huoneeseen

Siivousaineet ja -pyyhkeet

- mikrokuitupyyhkeet (kostea)
- yleispuhdistusaine

Pyykki ja jätteet

- tavalliset pyykki- ja jättepussit

Huomioitavaa

- jos sairastat akuuttia infektiota, et voi osallistua suojavarotoimin hoidettavan potilaan huoneen siivoukseen
- pyyhi yläpölyt ja puhdistat lattiakaivot loppusiivouksessa, ei hoitojakson aikana
- vaihda suihkuletkut puhtaisiin kerran viikossa
- älä avaa potilashuoneen ikkunaa hoitojakson aikana

Loppusiivous vuodeosastolla

- tavanomainen loppusiivous

7. Lutikat

Asiakas, jonka kotona todettu lutikoita ja torjuntatoimia ei ole tehty

Kun asiakas on vaihtanut puhtaan asun, omat vaatteet ja laukut on pakattu tiiviisiin pusseihin, eikä tilassa havaita lutikoita, voidaan hänen huoneensa siivota tavallisena potilaspaikkana.

Tilassa on havaittu tai epäillään olevan lutikoita

- Ota yksi lutikka teippiin kiinni tuholaistorjuaa varten. Tapa elävät lutikat niitä havaitessasi.
- Kysy osastonhoitajalta, onko tuholaistorjuja jo antanut ohjeita tilan suhteen. Toimi saatujen ohjeiden mukaisesti.
- Pidä huoneen ovi suljettuna. Tee siivous vasta tuholaistorjujan käytyä. Jos huoneessa on ollut varotoimin hoidettava potilas, ota yhteyttä hygieniahoitajaan siivouksesta ennen tuholaistorjujan käyntiä.

Suojautuminen

- kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kertakäyttöiset suojakäsineet

Kosketus- ja tasopintojen pyyhintä

- kertakäyttöiset siivouspyyhkeet
- yleispuhdistusaine tai mikrobin mukainen desinfektioaine, jos potilaalla ollut varotoimet

Pyykki ja jätteet

- Pakkaa kaikki pyykki ja jäte huoneessa. Älä kuljeta huoneesta mitään huoneesta pois pakkaamattomana.
- Pakkaa potilaspyykki ja vuodevaatteet liukenevaan pyykkipussiin ja laita se keltaiseen pyykkipussiin.
- Tavalliset jätepussit. Poikkeuksena Tays kampus, missä jätepussit pakataan punaiseen jätessäkkiin (biologinen ei-tunnistettava jäte). Tämä johtuu sisätiloihin sijoitetuista jätepuristimista.
- Sulje pyykki- ja jätepussit tiiviisti. Kirjaa pussien päälle Lutikka. Lutikoita sisältävää jätettä tai pyykkiä ei saa tiputtaa kuiluihin, tilaa kuljetus.

Siivous tuholaistorjujan käynnin jälkeen

- Huomioi tuholaistorjujan antamat ohjeet.
- Torjunta-aineen vaikutusajan jälkeen puhdista pinnat yleispuhdistusaineella ja kertakäyttöisillä siivouspyyhkeillä. Laita pyyhkeet suoraan jätteisiin. Vältä lattialistojen ja vaatekaapin saumojen pyyhintää, jotta torjunta-aine jäisi niihin vaikuttamaan.
- Huoneen saa ottaa käyttöön tuholaistorjujan ohjeiden mukaisesti, kun pinnat on puhdistettu.

Lisätietoa [lutikoista](#)

8. Wc-tilan vesikalusteiden klooraus sairaalan vuodeosastolla

Varotoimihuoneissa 1.3. CPE ja ESBL-Klebsiella tai 1.5 Candida auris tehdään loppusiivouksen yhteydessä wc-suihkutilan vesikalusteiden klooraus, jos potilas on ollut osastolla yön yli ja wc-suihkutilaa on käytetty. Potilashuoneen tai sulkuutilan käsiällasta ei kloorata.

Suojaimet

- nestettä läpäisemätön hihallinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina
- kumisaappaat
- hengityksensuojain FFP2
- suojalasit tai visiiri
- nitrilisuojakäsineet
 - vaihda käsineet, jos niihin tulee roiskeita
 - riisu käsineet välittömästi työskentelyn jälkeen

Tarvittavat välineet

- metallipöytä
- vuodesuoja ("kroonikkovaippa") metallipöydän suojaksi
- laimentamaton Klorilli
- mittakannu
- kieltokyltti/SEIS-tarra wc:n oveen

Toimintaohje

1. Pue suojaimet
2. Kaada rauhallisin liikkein Klorillia erilliseen mittakannuun suojatun metallipöydän päällä
3. Valuta Klorilli hitaasti vesikalusteiden sisäosiin
 - a. Käsienspesuallas 1,5 dl - kaada klorilli suoraan viemäriin, varo roiskeita altaan pohjalle (pyyhi mahdolliset roiskeet runsaalla vedellä kostutetulla paperilla, vaihda suojakäsineet)
 - b. Lattiakaivo 2 dl yläreunoja pitkin
 - c. Wc-istuin: 4 dl yläreunoja pitkin
4. Anna Klorillin vaikuttaa 60 min. Älä valuta wc-tilan hanoista vettä ennen vaikutusajan loppumista. Laita oveen kieltokyltti tai -tarra.

5. Riisu suojaimet

6. Pura apurato: laita välineet huuhteludesinfektiolaitteeseen ja pyyhi pinnat

Wc-tilan loppusiivous kloorauksen jälkeen

1. Pue suojaimet. Käytä FFP2-hengityksensuojainta wc-tilan siivouksen ajan.

2. Vaihda ensimmäisenä puhtaat suihkuletkut ja -päät.

3. Harjaa wc-pytyn ja lattiakaivon sisäosat omilla harjoillaan, aiemmin valutettu Klorilli riittää desinfektioaineeksi. Varo roiskeita.

4. Riisu suojakäsineet, desinfioi kädet ja pue uudet suojakäsineet.

5. Huuhtelee käsiallas, wc-istuin ja lattiakaivo varoen käsisuihkulla.

6. Tee huuhtelun jälkeen wc- ja suihkutilan loppusiivous ohjeiden mukaisesti.

- Voit käyttää Erisan Oxy+ 2 % tai Oxivir plus 3,5 % -käyttöliuosta, kun klorilli on huuhdeltu pois.
- Harjapese käsienpesu altaa alue desinfektioaineella, kuten normaalistikin.
- Wc-pytyn sisäosan sekä lattiakaivon harjausta ei tarvitse toistaa. Suihkuletkuja ja suihkupäitä ei tarvitse vaihtaa uudestaan.